

# *"TABAGISMO E GÊNERO NO BRASIL"*


*SEMINÁRIO INTERNACIONAL  
"CONTROLE SOCIAL DO TABACO EM DEBATE -  
PROPOSTAS DE ACTUAÇÃO"*

*13 DE NOVEMBRO 2006*

Ministério da Saúde

Nos países em desenvolvimento, os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina.


Já nos países desenvolvidos a participação das mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e 24% das mulheres fumam



**Nos últimos 15 anos aumentou em 30% a incidência do câncer de pulmão na mulher, enquanto permanece estável ou em ligeiro declínio entre os homens, o que comprova as conseqüências malignas que o cigarro causa à mulher.**

## NO BRASIL, O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTIMA QUE:

- Em torno de 200 mil mortes são decorrentes do tabagismo
- Um terço da população adulta fuma, sendo **11,2 milhões de mulheres** e **16,7 milhões de homens**
- Noventa por cento dos fumantes ficam dependentes da nicotina entre os **5 e os 19 anos**
- Atualmente, existem no País **2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária.**



## **BRASIL**

**Estimativa de Incidência de  
Câncer nas Mulheres para 2006:**

**237 480 casos novos/ano**

**Para 2005 foram estimados**

**58.610 óbitos por câncer (nas  
mulheres)**

# INCIDÊNCIA DE CÂNCER NAS MULHERES

**1º Mama**

**2º Colo uterino**

**3º Cólon e reto**

**4º Pulmão**

**5º Gástrico**

# **MORTALIDADE POR CÂNCER NAS MULHERES**

**1º Mama**

**2º Pulmão**

**3º Cólon e reto**

**4º Colo uterino**

**5º Gástrico**


# CÂNCER DE PULMÃO

Mortalidade entre 1979 e 2000:



57% Homens

134% Mulheres




Estimativas para o ano 2006 das taxas brutas de incidência por 100.000 e de número de casos novos por câncer, em mulheres, segundo localização primária.

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos			
	Estado		Capital	
	Casos	Taxa Bruta	Casos	Taxa Bruta
Mama Feminina	48.930	51,66	17.900	80,54
Traquéia, Brônquio e Pulmão	9.320	9,82	2.980	13,38
Estômago	8.230	8,65	2.610	11,55
Colo do Útero	19.260	20,31	6.030	27,11
Cólon e Reto	13.970	14,73	5.370	24,09
Esôfago	2.610	2,74	600	2,43
Leucemias	4.220	4,45	1.360	6,08
Cavidade Oral	3.410	3,58	1.130	4,92
Pele Melanoma	3.050	3,16	940	4,02
Outras Localizações	63.320	66,78	22.750	102,17
<b>Subtotal</b>	<b>176.320</b>	<b>185,95</b>	<b>61.670</b>	<b>276,96</b>
Pele não Melanoma	61.160	64,53	15.340	68,92
<b>Todas as Neoplasias</b>	<b>237.480</b>	<b>250,45</b>	<b>77.010</b>	<b>345,94</b>

**O número de casos novos de câncer de pulmão, estimados para o Brasil em 2006 é de 17.850 entre homens e de 9.320 nas mulheres.**

Risco estimado:

- 19 casos novos a cada 100 mil homens
- 10 para cada 100 mil mulheres




*Coeficientes de incidência\* estimados para os tipos de câncer mais freqüentes (exceto pele não-melanoma) em mulheres, no Brasil e regiões geográficas, 2006*

	Brasil	Região Norte	Região Nordeste	Região Centro-Oeste	Região Sudeste	Região Sul
1º	Mama feminina (51,7)	Colo do Útero (21,7)	Mama feminina (27,2)	Mama feminina (38,0)	Mama feminina (70,5)	Mama feminina (69,0)
2º	Colo do Útero (20,3)	Mama feminina (15,2)	Colo do Útero (16,7)	Colo do Útero (21,4)	Cólon e Reto (21,1)	Colo do Útero (27,8)
3º	Cólon e Reto (14,7)	Estômago (5,8)	Cólon e Reto (5,4)	Cólon e Reto (10,3)	Colo do Útero (19,6)	Cólon e Reto (21,8)
4º	Pulmão (9,8)	Pulmão (5,0)	Estômago (5,2)	Pulmão (8,6)	Pulmão (11,9)	Pulmão (16,2)
5º	Estômago (8,7)	Cólon e Reto (3,7)	Pulmão (4,9)	Estômago (6,5)	Estômago (10,8)	Estômago (11,4)

Para as mulheres é o quarto mais freqüente nas regiões:

- Sul (16/100.000)
- Sudeste (12/100.000)
- Centro-Oeste (9/100.000)
- Norte (5/100.000)

É o quinto mais freqüente na região Nordeste (5/100.000)



## Câncer pulmonar e tabagismo.

Nas mulheres, pode-se atribuir cerca de **metade dos casos de câncer pulmonar ao tabagismo.**

Este hábito é capaz de aumentar este risco em 20 a 30 vezes em tabagistas de longa data e em 30 a 50% em fumantes passivas, não existindo nenhuma dose ou quantidade segura para o consumo.

As taxas de incidência em um determinado país refletem seu consumo de cigarros.

# ***CÂNCER DE PULMÃO E A SAÚDE DAS MULHERES***

- ✓ 25% das mulheres brasileiras fumam
- ✓ **O número de mulheres fumantes vem aumentando, sobretudo nas faixas etárias mais jovens.**
- ✓ aumento da ocorrência de doenças (antes quase que próprias dos homens) como IAM – infarto agudo do miocárdio, AVCs e **CÂNCER DE PULMÃO**

✓ aumento na incidência e agravamento de inúmeras outras doenças e agravos que podem ocorrer em relação à saúde reprodutiva


✓ Um estudo realizado em 1997 entre estudantes de 10 capitais brasileiras, mostrou que em pelo menos sete capitais, as meninas vêm experimentando cigarros em maior proporção que os meninos.

✓ cerca de 90% dos portadores do câncer de pulmão são fumantes

✓ um terço da população adulta fuma, sendo **11,2 milhões de mulheres** e **16,7 milhões de homens**

# Tabagismo e seus efeitos à saúde da mulher...

- 1. Saúde reprodutiva: contraceptivo oral e fumo: risco de desenvolver doenças cardiovasculares passa a ser 20 a 40 vezes maior (*WHO, 2001*).**
- 2. Alguns estudos sugerem que o tabagismo pode alterar a função menstrual aumentando o risco de dismenorréia, amenorréia secundária e irregularidades menstruais. [http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr\\_forwomen/](http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_forwomen/)).**




**3. Estudos sugerem que mulheres fumantes apresentam menopausa natural em idades mais jovens do que as não fumantes, além de poderem apresentar sintomas de menopausa mais severos.(CDC, 2001 [http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr\\_forwomen/](http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_forwomen/)).**

## **4. As grávidas fumantes apresentam:**

- **3 vezes mais chance de ter um bebê de baixo-peso**, condição que por sua vez está diretamente relacionada a doenças e mortes na infância.
- **maior risco de aborto, natimorto e morte de recém nascido.**
- **maior risco de gerarem fetos com malformações , lábio leporino e fenda palatina.**

**A PNAISM vem implementando ações de saúde que contribuem para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis.**

**Desta forma, é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil epidemiológico desta doença e no planejamento de ações de saúde que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher.**



**A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o tabagismo como a principal causa de morte evitável em todo o mundo.**

**A participação do Tabagismo e outros derivados na etiologia deste câncer enfatiza a importância da Convenção – Quadro para o controle do Fumo no Brasil e no mundo.**

## ***Objetivos gerais***

- ***Reduzir a morbimortalidade por Câncer de Pulmão nas Mulheres através de medidas específicas em relação ao Tabagismo, diagnóstico precoce e tratamento.***

## ***Objetivos específicos***

- 1. Desenvolver ações conjuntamente com o INCA e outros atores governamentais e não governamentais envolvidos, para o desenvolvimento de medidas estratégicas para promoção da saúde, controle do tabagismo nas mulheres, com ampliação e qualificação da rede de saúde para o seu acolhimento.***

## ***Objetivos específicos(cont.)***

- 2. Educação em saúde, com disseminação dos dados atuais alarmantes, assim como dos fatores de risco, principalmente desestimulando o tabagismo e seu início precoce nas mulheres.***
- Estimular pesquisas clínicas sobre o Câncer de pulmão e as especificidades do Gênero feminino.***



Agradeço a Atenção!

[mazearaujo@saude.gov.br](mailto:mazearaujo@saude.gov.br)